



ESTUDO DIRIGIDO PSI

Psicopatologia Geral e Transtornos Psiquiátricos
Prof^a. Clarisse Rinaldi S. de Santiago

Questões

Julgue os itens a seguir, a respeito de psicopatologia e diagnóstico diferencial.

- 132 O sintoma mais comum do transtorno de ansiedade generalizada é a apreensão inespecífica; o do transtorno obsessivo-compulsivo é a fixação em um tema preferencial, como sujeira ou contaminação.
- 133 A toxicomania e a psicose apresentam alguns pontos em comum, entre os quais se incluem a precariedade subjetiva e a forclusão da lei paterna.
- 134 A depressão e a melancolia, manifestações da mesma estrutura psíquica, apresentam os seguintes sintomas: negativismo, falta de ânimo, fantasias autodestrutivas e distúrbios somáticos.
- 135 As manifestações de tristeza, luto e irritabilidade são transtornos indicativos de depressão severa e devem ser tratados com antidepressivos.
- 136 O comportamento de evitação e as compulsões são muito comuns nos casos de transtorno obsessivo-compulsivo; nas fobias, não se verifica ocorrência de obsessões ou compulsões.
- 137 Pesadelos, sonhos recorrentes, fobia a situação, pessoa ou lugar associados a estressor que tenha causado risco de morte são sintomas típicos de estresse pós-traumático.
- 138 A maioria dos pacientes com transtorno obsessivo compulsório (TOC) é acometida de ataques de ansiedades, com características de ataque de pânico, sendo esses ataques secundários aos medos obsessivos de contaminação, por exemplo.

GABARITO

132 C

133 C

134 E

135 E

136 C

137 C

138 C

Julgue o próximo item, acerca da psicopatologia.

Pacientes com amnésia dissociativa apresentam incapacidade de recordar informações pessoais importantes, geralmente traumáticas ou estressantes, demasiadamente extensa para ser explicada como um esquecimento normal. Essa incapacidade pode ou não ocorrer durante o curso de um transtorno dissociativo, sem a ocorrência de transtornos orgânicos associados.

Certo Errado

Julgue o próximo item, acerca da psicopatologia.

Pacientes com amnésia dissociativa apresentam incapacidade de recordar informações pessoais importantes, geralmente traumáticas ou estressantes, demasiadamente extensa para ser explicada como um esquecimento normal. Essa incapacidade pode ou não ocorrer durante o curso de um transtorno dissociativo, sem a ocorrência de transtornos orgânicos associados.

Certo Errado

Resposta: Certo

Julgue o item que se segue, referente a estruturas clínicas.

Os transtornos psicossomáticos decorrentes de traumas revividos ocasionam o estresse pós-traumático.

Certo Errado

Julgue o item que se segue, referente a estruturas clínicas.

Os transtornos psicossomáticos decorrentes de traumas revividos ocasionam o estresse pós-traumático.

Certo Errado

Resposta: Errado

A respeito do transtorno depressivo persistente, assinale a opção correta.

- a) Um adolescente pode ser diagnosticado com transtorno depressivo persistente se manifestar humor deprimido diariamente, durante, no mínimo, dois anos.
- b) O transtorno depressivo persistente causa menos danos ao desempenho social e profissional de um indivíduo que o transtorno depressivo maior.
- c) O transtorno depressivo persistente abarca a consolidação do transtorno depressivo maior crônico e transtorno distímico.
- d) A manifestação dos sintomas do transtorno depressivo persistente ocorre apenas tardiamente no indivíduo.
- e) Em caso de comorbidade do transtorno depressivo persistente com quaisquer transtornos de personalidade, deve prevalecer o diagnóstico referente ao transtorno de personalidade, já que este configura um quadro irreversível.

A respeito do transtorno depressivo persistente, assinale a opção correta.

- a) Um adolescente pode ser diagnosticado com transtorno depressivo persistente se manifestar humor deprimido diariamente, durante, no mínimo, dois anos.
- b) O transtorno depressivo persistente causa menos danos ao desempenho social e profissional de um indivíduo que o transtorno depressivo maior.
- c) O transtorno depressivo persistente abarca a consolidação do transtorno depressivo maior crônico e transtorno distímico.
- d) A manifestação dos sintomas do transtorno depressivo persistente ocorre apenas tardiamente no indivíduo.
- e) Em caso de comorbidade do transtorno depressivo persistente com quaisquer transtornos de personalidade, deve prevalecer o diagnóstico referente ao transtorno de personalidade, já que este configura um quadro irreversível.

Resposta: C

No que concerne ao transtorno de personalidade antissocial, assinale a opção correta.

- a) Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial apresentam dificuldade extrema de ser empáticos e tendem a ter autoconceito inflado e arrogante.
- b) Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial sentem remorso e vergonha após os episódios de raiva extrema, quando percebem os danos causados a terceiros e a si mesmos.
- c) Os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são assertivos em suas carreiras, capazes de planejar o próprio futuro e de agir de forma controlada.
- d) Ao manifestar comportamentos agressivos, o indivíduo com transtorno de personalidade antissocial põe em risco a segurança das pessoas a seu redor, mas permanece atento à preservação da própria segurança.
- e) É possível realizar o diagnóstico desse tipo de transtorno de personalidade em indivíduos com idade a partir de doze anos.

No que concerne ao transtorno de personalidade antissocial, assinale a opção correta.

- a) Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial apresentam dificuldade extrema de ser empáticos e tendem a ter autoconceito inflado e arrogante.
- b) Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial sentem remorso e vergonha após os episódios de raiva extrema, quando percebem os danos causados a terceiros e a si mesmos.
- c) Os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são assertivos em suas carreiras, capazes de planejar o próprio futuro e de agir de forma controlada.
- d) Ao manifestar comportamentos agressivos, o indivíduo com transtorno de personalidade antissocial põe em risco a segurança das pessoas a seu redor, mas permanece atento à preservação da própria segurança.
- e) É possível realizar o diagnóstico desse tipo de transtorno de personalidade em indivíduos com idade a partir de doze anos.

Resposta: A

O transtorno do estresse pós-traumático é uma condição que surge após a exposição a eventos traumáticos, ameaçadores, e implica importantes consequências para a pessoa afetada. Assinale a opção correta a respeito dos sintomas e das condições típicos desse transtorno.

- a) O evento traumático é definido por ameaça à vida da própria pessoa ou por violência sexual contra ela.
- b) O evento traumático deve ocorrer a partir do final da adolescência ou início da idade adulta.
- c) O esquecimento de detalhes relevantes do evento traumático pode acontecer, enquanto a lembrança de outros detalhes ocorre de modo intrusivo.
- d) A pessoa apresenta respostas excessivas de alegria e satisfação frente a situações simples, geralmente consideradas neutras ou pouco relevantes.
- e) A pessoa apresenta desrealização, sobressaltos, insistência em falar sobre o local do evento estressor e em visitá-lo.

O transtorno do estresse pós-traumático é uma condição que surge após a exposição a eventos traumáticos, ameaçadores, e implica importantes consequências para a pessoa afetada. Assinale a opção correta a respeito dos sintomas e das condições típicos desse transtorno.

- a) O evento traumático é definido por ameaça à vida da própria pessoa ou por violência sexual contra ela.
- b) O evento traumático deve ocorrer a partir do final da adolescência ou início da idade adulta.
- c) O esquecimento de detalhes relevantes do evento traumático pode acontecer, enquanto a lembrança de outros detalhes ocorre de modo intrusivo.
- d) A pessoa apresenta respostas excessivas de alegria e satisfação frente a situações simples, geralmente consideradas neutras ou pouco relevantes.
- e) A pessoa apresenta desrealização, sobressaltos, insistência em falar sobre o local do evento estressor e em visitá-lo.

Resposta: C

Durante a adolescência, João começou a apresentar alguns comportamentos diferentes dos da maioria das pessoas. Isso, de alguma forma, lhe trouxe problemas, dificuldades e sofrimentos. Ao iniciar o processo terapêutico, foi diagnosticado que ele tinha transtorno de personalidade evitativa.

Considerando esse diagnóstico, assinale a opção que descreve as principais características de personalidade de João.

- a) percepção de si mesmo como inadequado, inibição social e forte preocupação quanto à possibilidade de ser mal avaliado ou rejeitado pelas pessoas
- b) provocação intencional de lesões no corpo ou falsificação de sinais que simulem doenças, sem que haja qualquer ganho aparente como consequência
- c) preferência por atividades solitárias, desinteresse por relações pessoais íntimas, pouco ou nenhum interesse em relações sexuais e aparente indiferença a elogios e críticas
- d) sentimento de vazio, esforços claros para evitar o abandono imaginário ou real, ameaças recorrentes de suicídio e episódios de irritabilidade e de ansiedade
- e) forte desconfiança, crença de que as pessoas podem estar mal intencionadas com ele na vida social ou afetiva, percepção de intenção ameaçadora onde não há

Durante a adolescência, João começou a apresentar alguns comportamentos diferentes dos da maioria das pessoas. Isso, de alguma forma, lhe trouxe problemas, dificuldades e sofrimentos. Ao iniciar o processo terapêutico, foi diagnosticado que ele tinha transtorno de personalidade evitativa.

Considerando esse diagnóstico, assinale a opção que descreve as principais características de personalidade de João.

- a) percepção de si mesmo como inadequado, inibição social e forte preocupação quanto à possibilidade de ser mal avaliado ou rejeitado pelas pessoas
- b) provocação intencional de lesões no corpo ou falsificação de sinais que simulem doenças, sem que haja qualquer ganho aparente como consequência
- c) preferência por atividades solitárias, desinteresse por relações pessoais íntimas, pouco ou nenhum interesse em relações sexuais e aparente indiferença a elogios e críticas
- d) sentimento de vazio, esforços claros para evitar o abandono imaginário ou real, ameaças recorrentes de suicídio e episódios de irritabilidade e de ansiedade
- e) forte desconfiança, crença de que as pessoas podem estar mal intencionadas com ele na vida social ou afetiva, percepção de intenção ameaçadora onde não há

Resposta: A

São fenômenos associados à síndrome da dependência do álcool

- a) o nistagmo e a afasia de compreensão.
- b) as alucinações visuais e as parassonias.
- c) a autonegligência e as ideias delirantes.
- d) o empobrecimento do repertório e a negação.
- e) a ataxia e os transtornos dos movimentos oculares.

São fenômenos associados à síndrome da dependência do álcool

- a) o nistagmo e a afasia de compreensão.
- b) as alucinações visuais e as parassonias.
- c) a autonegligência e as ideias delirantes.
- d) o empobrecimento do repertório e a negação.
- e) a ataxia e os transtornos dos movimentos oculares.

Resposta: D

- 11) A respeito do transtorno disruptivo da desregulação do humor, assinale a opção correta.
- a) É possível que haja comorbidade entre o transtorno disruptivo da desregulação do humor e o transtorno explosivo intermitente.
 - b) A principal característica é a alternância entre irritabilidade e fase depressiva.
 - c) A prática de violência verbal durante fase de irritabilidade não é critério suficiente para que um indivíduo seja diagnosticado com transtorno disruptivo da desregulação do humor.
 - d) A idade correta para fechar o diagnóstico desse transtorno é somente após os dezoito anos de idade.
 - e) Um indivíduo com transtorno disruptivo da desregulação do humor pode apresentar comorbidade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

- 11) A respeito do transtorno disruptivo da desregulação do humor, assinale a opção correta.
- a) É possível que haja comorbidade entre o transtorno disruptivo da desregulação do humor e o transtorno explosivo intermitente.
 - b) A principal característica é a alternância entre irritabilidade e fase depressiva.
 - c) A prática de violência verbal durante fase de irritabilidade não é critério suficiente para que um indivíduo seja diagnosticado com transtorno disruptivo da desregulação do humor.
 - d) A idade correta para fechar o diagnóstico desse transtorno é somente após os dezoito anos de idade.
 - e) Um indivíduo com transtorno disruptivo da desregulação do humor pode apresentar comorbidade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Resposta: ANULADA

- a) Não pode coexistir com TOD, transt. Explosivo intermitente e transt. bipolar.
- b e c) Explosões de raiva e humor irritado/zangado.
- d) Diagnóstico entre 6 e 18 anos.
- e) Pode haver comorbidade com TDAH, transt. depressivo maior e transt. de ansiedade.



ESTUDO DIRIGIDO PSI